

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第1類医薬品

説明書

壮年性脱毛症における発毛剤

ボズレーMX1 Women

特徴

○有効成分であるミノキシジルを1%配合した女性用の発毛剤です。

○1回の使用量(1mL)を計量できる容器です。

使用上の注意

×してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こる可能性があります。)

- 1. 次の人は使用しないでください。
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 未成年者(20歳未満)。
(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人、並びに授乳中の人。
(4) 妊娠、出産に伴い脱毛している人。
(5) 避妊用ピルの使用をやめたことにより脱毛している人。
(6) 壮年性脱毛症以外の脱毛症(例えば、甲状腺疾患、急激なダイエット、円形脱毛症等)の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。
(7) 頭頂部だけでなく、側頭部や後頭部も含めた頭部全体が脱毛している人。
(8) 脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。
(9) 頭皮から強く引っ張るような髪型によって脱毛している人。
(10) 男性。
2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。
(2) きず、湿疹あるいは炎症(発赤)等がある頭皮。
3. 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤(軟膏、液剤等)の頭皮への使用は、避けてください。
また、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。
[これらの薬剤は本剤の吸収に影響を及ぼす可能性があります。]

相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 今までに薬や化粧品等によりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
(2) 高血圧の人、低血圧の人。
(3) 心臓又は腎臓に障害のある人。
(4) むくみのある人。
(5) 家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。
(6) 高齢者(65歳以上)。
(7) 次の診断を受けている人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

Table with 2 columns: 関係部位, 症状. Rows include 皮膚 (頭皮の発疹・発赤*, かゆみ, かぶれ, ぶけ, 使用部位の熱感等), 精神神経系 (頭痛, 気が遠くなる, めまい), 循環器 (胸の痛み, 心拍が速くなる), 代謝系 (原因のわからない急激な体重増加, 手足のむくみ).

*頭皮以外にあらわれることもあります。

- 3. 6ヵ月間使用して、次のいずれにおいても改善が認められない場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
4. 使用開始後6ヵ月以内であっても、脱毛状態の悪化や、次のような脱毛が見られた場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

その他の注意

- 1. 毛髪が成長するには時間がかかります。効果がわかるようになるまで少なくとも6ヵ月間、毎日使用してください。
2. 毛髪が成長する程度には個人差があり、本剤は誰にでも効果があるわけではありません。
3. 効果を維持するには継続して使用することが必要で、使用を中止すると徐々に元に戻ります。

効能・効果

壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防。



図よりも脱毛している場合には、効果が得られない可能性があります。

用法・用量

成人女性(20歳以上)が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布してください。

<注意>

- (1) 用法・用量の範囲より多量に使用しても、あるいは頻繁に使用しても効果はあがりません。定められた用法・用量を厳守してください。
(2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
(3) 薬液のついた手で、目等の粘膜にふれると刺激があるので、手についた薬液はよく洗い落としてください。
(4) 髪の長い人は、髪を押し広げ、髪に薬液がつかぬよう、頭皮に丁寧に塗布してください。
(5) アルコール等に溶けるおそれのあるもの(メガネわく、化学繊維等)にはつかないようにしてください。
(6) 整髪料及びヘアセットスプレーは、本剤を使用した後に使用してください。
(7) 染毛剤(ヘアカラー、毛染め、白髪染め等)を使用する場合には、完全に染毛を終えた後に本剤を使用してください。
(8) つけ毛やヘアピースを着用の方は本剤を十分に乾燥させた後に装着してください。

成分・分量(100mL中)

Table with 3 columns: 成分, 分量, はたらき. Rows include ミノキシジル (1.0g), パントテニールエチルエーテル (1.0g), トコフェロール酢酸エステル (0.08g), l-メントール (0.3g).

添加物: エタノール、1,3-ブチレングリコール、プロピレングリコール、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、pH調整剤

保管及び取扱い上の注意

- 1. 使用后、キャップをして、直射日光や高温、寒冷の場所を避け、涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
4. 火気に近づけないでください。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

本製品のお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
連絡先: 株式会社アデランスメディカルリサーチ
電話: 03-6388-9417
受付時間: 平日10:00~17:00

<副作用被害救済制度のお問い合わせ先>

(独)医薬品医療機器総合機構
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話: 0120-149-931(フリーダイヤル)

販売元: 株式会社アデランスメディカルリサーチ 東京都新宿区新宿3-1-9 ADビル東館2F・3F

発売元: 株式会社アデランス 東京都新宿区新宿1-6-3

製造販売元: 大興製薬株式会社 埼玉県川越市下赤坂560番地1

容器の使用法 (ご使用前に必ずお読みのうえ、正しくお使いください)


■ 塗布方法

1回の使用量(1mL)を以下1~5の方法で塗布してください。

1

ボトルを立ててキャップを真上にはずします。次に回転部の「△」マークを矢印の方向に回して、「▲はかる」マークに合わせます。


注意：キャップを回したり、斜めにはずすと、故障の原因になります。
「▲はかる」マークをこえて無理に回すと故障の原因になります。



2

ボトルが真下を向くよう逆さにします(2~3秒程度)。逆さにすると薬液1mLがたまります。


注意：逆さにした後ボトルを振らないでください。薬液がたれる可能性があります。
下記イラストのように目に見える範囲以外の部分にも薬液がたまります。



3

薬液がたまった後、ボトルを真下に向けたまま回転部の「△」マークを矢印の方向に回して、「▲ぬる」マークに合わせます。「▲ぬる」マークに合わせることで、1回の使用量(1mL)が計量されます。

注意：回転部の「△」マークが「▲ぬる」マークにしっかり合っていないと、1mLを正しく計量できません。また、塗布する際、一度に多量の薬液が出たり、ボトル本体から1mLを超えて薬液が出続けてしまう場合があります。




4

逆さのまま回転部の先端を頭皮に垂直に軽く押し当てると、薬液が出てきます。薬液が完全に出なくなるまで、髪の毛の薄い部分全体に塗布してください。

注意：回転部の「△」マークが「▲はかる」マークに合っているときは、回転部の先端が押しこめない仕様となっており、無理に塗布すると頭皮をきずつける可能性があります。

先端を頭皮に軽く押し当て、髪の毛の薄い部分全体に塗布する

薬液は外側から見える範囲以外にも充填されており、半分以上塗布することで、液面が下がってくるのが確認できます。



5

使用後は、回転部の「△」マークを「▲ぬる」マークに合わせたまま、キャップを閉めて保管してください。

注意：保管状態により、薬液が変色(微黄色)することがありますが、製品の品質に問題はありません。

(誤飲防止のため、回転部とボトルは外れにくくなっております)
※イラストはイメージです